

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII – POZIOM ROZSZERZONY
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie na temat) są traktowane jako błędne. Komentarze wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu. Rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, oceniane są zgodnie z zasadami punktacji.

- Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.
- Jeżeli polecenie brzmi: *Napisz równanie reakcji...*, to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat.
- Niewłaściwy dobór lub brak współczynników w równaniu reakcji powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania.
- W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym wielkości mianowanej powoduje utratę 1 punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglenie wyników liczbowych.
- Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów.
- Za poprawne spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia zdający nie otrzymuje punktów.

Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) nie odejmuje się punktów.

Zapis „↑”, „↓” w równaniach reakcji nie jest wymagany.

W równaniach reakcji, w których ustala się stan równowagi, brak „ \rightleftharpoons ” nie powoduje utraty punktów.

Elementy odpowiedzi umieszczone w nawiasach nie są wymagane.

Numer zadania	Kryteria oceniania Oczekiwana odpowiedź	Uwagi	Punktacja	
			za umiejętność	sumaryczna
1	Za narysowanie klatkowego modelu konfiguracji elektronów walencyjnych: <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">↓↑ (4s²)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">↑ ↑ ↑ (4p³)</div> </div>	Zwroty strzałek na podpowłóce 4p mogą być przeciwne niż na rysunku, ale wszystkie muszą być takie same.	1	1
2	Za podanie symbolu pierwiastka Y oraz wartości liczby masowej jego izotopu: Symbol pierwiastka Y: C Liczba masowa A ₂ : 13		1	1
3	Za dokończenie obu zdań: 1. W cząsteczce amoniaku atomowi azotu przypisuje się hybrydyzację (sp / sp ² / <u>sp³</u>). 2. Spośród (dwóch / trzech / <u>czterech</u>) zhybrydizowanych orbitali atomu azotu jeden jest obsadzony przez (wiążącą / <u>niewiążącą</u>) parę elektronową.	Po 1 p. za uzupełnienie każdego zdania.	2 x 1	2
4	a) Za określenie stanu skupienia wodorków: X gazowy lub gaz Y gazowy lub gaz		1	2
	b) Za określenie położenia pierwiastków i wskazanie bloku energetycznego: Pierwiastek X leży w okresie trzecim lub 3 lub III , pierwiastek Y leży w okresie piątym lub 5 lub V Blok energetyczny: p		1	
5	Za wybór i podkreślenie wzorów wszystkich substancji niejonowych: <u>CO₂</u> <u>N₂</u> Na ₂ CO ₃ NaOH <u>NO₂</u> NH ₄ Cl		1	1
6	Za metodę rozwiązania uwzględniającą zmianę stężeń substratu A i B Za obliczenia i wynik z jednostką: 3·10⁻³ mol·dm⁻³·s⁻¹		1 1	2





	<p>Przykład rozwiązania:</p> $c_A^0 = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ $c_B^0 = 0,4 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ $c_A' = \frac{1}{2} \cdot c_A^0 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ <p>Z równania reakcji wynika, że $n_A = n_B$, więc n_B zmniejszy się o 0,1 mola w 1 dm³ roztworu</p> $c_B' = 0,3 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ <p>więc $v' = k \cdot c_A' \cdot c_B' = 0,1 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot 0,3 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$</p> $v' = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1} \text{ lub } v' = 0,003 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}}$ $\text{lub } v' = 0,003 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1} \text{ lub } v' = 3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}}$						
7	a) Za określenie.:		1	2			
	(reakcja) egzotermiczna b) Za ustalenie wartości i jednostki standardowej entalpii tworzenia: – 45,94 kJ/mol lub – 45,94 kJ·mol ⁻¹ lub ≈ – 46 kJ·mol ⁻¹		1				
8	Za napisanie równań reakcji: Etap 1: $4\text{NH}_3 + 7\text{O}_2 \xrightarrow{(\text{Pt lub katalizator, T})} 4\text{NO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ Etap 2: $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$ Etap 3: $\text{HNO}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{NO}_3$ lub $\text{HNO}_3 + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	Po 1 p. za każde równanie.	3 x 1	3			
9	Za wskazanie drobin tworzących sprzężone pary:		1	1			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Sprzężona para 1</td> <td style="width: 33%;">Kwas 1: H₂O</td> <td style="width: 33%;">Zasada 1: OH⁻</td> </tr> <tr> <td>Sprzężona para 2</td> <td>Kwas 2: NH₄⁺</td> <td>Zasada 2: NH₃</td> </tr> </table>	Sprzężona para 1	Kwas 1: H ₂ O		Zasada 1: OH ⁻	Sprzężona para 2	Kwas 2: NH ₄ ⁺
Sprzężona para 1	Kwas 1: H ₂ O	Zasada 1: OH ⁻					
Sprzężona para 2	Kwas 2: NH ₄ ⁺	Zasada 2: NH ₃					

<p>10</p>	<p>Za podanie stosunku objętości kwasu solnego:</p> $\frac{V_k}{V_p} = \frac{100}{1} \quad \text{lub} \quad \frac{V_k}{V_p} = 100$ <p>Przykłady rozwiązań:</p> <p><u>I sposób</u></p> <p>Wzrost pH o 2 jednostki to zmniejszenie stężenia jonów H^+ $10^2 = 100$ razy, więc objętość końcowa musiała być większa 100 razy <i>lub</i> trzeba zwiększyć objętość 100-krotnie.</p> <p><u>II sposób</u></p> <p>HCl – mocny kwas, więc $[H^+]_1 = c_{HCl} = 0,1 \text{ mol/dm}^3$</p> <p>$pH_1 = -\log [H^+] = -\log 0,1 = -\log 10^{-1} = 1$</p> <p>$pH_2 = pH_1 + 2 = 1 + 2 = 3$, więc $[H^+]_2 = 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$,</p> <p>więc $c_{HCl}' = 10^{-3} \text{ mol/dm}^3 = 0,001 \text{ mol/dm}^3$ i $n_{HCl} = \text{const}$,</p> <p>więc $\frac{V_k}{V_p} = \frac{100}{1}$</p>	<p>Zdający nie musi zapisać obliczeń i działań na jednostkach, ale jeżeli obliczenia i działania na jednostkach są, to muszą być poprawne.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>11</p>	<p>Za metodę rozwiązania prowadzącą do powiązania szukanej z danymi Za obliczenia i wynik z jednostką podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:</p> $4,34 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad \text{lub} \quad 4,34 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ <p>Przykład rozwiązania:</p> <p><u>I sposób</u></p> <p>$M_{HNO_3} = 63 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ $c_p = 24,00\%$ $d = 1,14 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 1,14 \cdot 10^3 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$</p> <p>$(c_m = \frac{n}{V} \quad n = \frac{m}{M} \quad V = \frac{m_r}{d})$</p> <p>$\Rightarrow c_m = \frac{c_p \cdot d}{M \cdot 100\%} = \frac{24,00\% \cdot 1,14 \cdot 10^3 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}}{63 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 100\%} = 4,34 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$</p>	<p>Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych wcześniejszych zaokrążeń. Należy uznać za poprawne wszystkie wyniki, będące konsekwencją przyjętych przez zdającego poprawnych zaokrążeń.</p>	<p>1 1</p>	<p>2</p>




	<p><u>II sposób</u></p> $M_{\text{HNO}_3} = 63 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad c_p = 24,00\% \quad d = 1,14 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 1,14 \cdot 10^3 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$ $1 \text{ dm}^3 \text{ roztworu} \text{ --- } 1,14 \cdot 10^3 \text{ g}$ $100 \text{ g roztworu} \text{ --- } 24,00 \text{ g HNO}_3$ $\underline{1140 \text{ g roztworu} \text{ --- } x}$ $x = 273,6 \text{ g HNO}_3$ $1 \text{ mol HNO}_3 \text{ --- } 63 \text{ g}$ $\underline{x \text{ --- } 273,6 \text{ g}}$ $x = 4,34 \text{ mola}$ $\Rightarrow c_m = 4,34 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$			
12	<p>a) Za uzupełnienie schematu doświadczenia:</p> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">zawiesina świeżo wytrąconego osadu $\text{Zn}(\text{OH})_2$</p> </div>	Wybrane odczynniki mogą być odwrotnie przyporządkowane próbkom I i II.	1	4
	<p>b) Za podanie obserwowanych zmian, np.:</p> <p>W obu próbkach osad rozpuści się lub rozтворzy lub zniknie.</p>		1	
	<p>c) Za napisanie równań reakcji odpowiednio do uzupełnienia schematu w części a) zadania:</p> <p>Probówka I: $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>Probówka II: $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$</p> <p>lub $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$</p>		2 x 1	
13	<p>a) Za dokończenie równania reakcji:</p> $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2 + 8 \text{H}^+ \rightleftharpoons 10\text{Ca}^{2+} + 6\text{HPO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$		1	2

	b) Za określenie wpływu, np.: – zmniejsza <i>lub</i> szkliwo wolniej ulega odwapnieniu <i>lub</i> hamuje proces odwapnienia szkliwa – zwiększa <i>lub</i> szkliwo szybciej ulega odwapnieniu <i>lub</i> przyspiesza odwapnienie szkliwa	Odpowiedź typu <i>będzie powstawało więcej/mniej szkliwa jest niepoprawna.</i>	1	
14	Za napisanie równań reakcji elektrodowych: Równanie reakcji katodowej: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ <i>lub</i> $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^-$ Równanie reakcji anodowej: $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ <i>lub</i> $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}_2$ <i>lub</i> $2\text{Cl}^- \rightarrow 2\text{Cl} + 2\text{e}^-$ (i $2\text{Cl} \rightarrow \text{Cl}_2$)		1	1
15	a) Za zapis równania reakcji: $2\text{Fe}^{3+} + \text{Sn}^{2+} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{Sn}^{4+}$	Zapis \rightleftharpoons powoduje utratę punktu.	1	3
	b) Za zapis schematu ogniwa: $\text{Pt} \mid \text{Sn}^{2+}, \text{Sn}^{4+} \parallel \text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+} \mid \text{Pt}$		1	
	c) Za obliczenie SEM ogniwa – podanie wartości liczbowej z jednostką: (SEM = $0,771 \text{ V} - 0,151 \text{ V} = $) $0,620 \text{ V}$ <i>lub</i> $0,62 \text{ V}$	Jeśli zdający zapisze obliczenia, to muszą być one poprawne.	1	
16	a) Za napisanie równań procesu redukcji i procesu utleniania – po 1 p. za każde równanie: Równanie procesu redukcji: $\text{ClO}^- + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}/(\text{x } 3)$ <i>lub</i> $\text{ClO}^- + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{OH}^-/(\text{x } 3)$ Równanie procesu utleniania: $\text{Cr}(\text{OH})_3 + 5\text{OH}^- \rightarrow \text{CrO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^-/(\text{x } 2)$		2 x 1	4
	b) Za uzupełnienie równania: $2\text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{ClO}^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{CrO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$		1	
	c) Za określenie funkcji anionów chloranowych(I): utleniacz		1	

17	Za ustalenie objętości roztworu substancji B: 35,0 (cm³)				1	1	
18	Za określenie barwy fenoloftaleiny, np.: malinowa lub różowa				1	1	
19	Za wybór związków: Substancja A: HNO₃ Substancja B: KOH				1	1	
20	a) Za wybór odczynnika X: K ₂ SO ₄ <u>K₂SO₃</u> KNO ₃			Jeżeli zdający błędnie wybierze odczynnik w p. a), otrzymuje 0 p. za całe zadanie.	1	3	
	b) Za uzupełnienie tabeli:				1		
	Zaobserwowane zmiany po dodaniu wybranego odczynnika		Numer próbówki				
	Roztwór w próbówce stał się zielony.		II				
Roztwór w próbówce odbarwił się.		I					
c) Za określenie czynnika, np.: środowisko (reakcji) lub pH środowiska (reakcji) lub odczyn środowiska (reakcji) lub pH roztworu (reakcji) lub odczyn roztworu (reakcji)			Określenie musi jednoznacznie wskazywać na środowisko reakcji (pH roztworu).	1			
21	Za określenie stopni utlenienia:			Użycie cyfr arabskich (- 2, 2) oraz zapis +II lub +2 nie powoduje utraty punktów.	1	1	
	Wzory związków organicznych	CH ₃ OH	HCHO				HCOOH
	Stopnie utlenienia atomów węgla	- II	0				II

<p>22</p>	<p>Za napisanie równań reakcji :</p> <p>Równanie reakcji I: $\text{HC}\equiv\text{CH} + \text{HCl} \longrightarrow \text{H}_2\text{C}=\underset{\text{Cl}}{\text{CH}} \quad \text{lub} \quad \text{CH}_2 = \text{CHCl}$</p> <p>Równanie reakcji II: $n \text{H}_2\text{C}=\underset{\text{Cl}}{\text{CH}} \xrightarrow{\text{(p, T, katalizator)}} \left(\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}} \right)_n$</p> <p><i>lub</i></p> $n \text{CH}_2 = \text{CHCl} \xrightarrow{\text{(p, T, katalizator)}} \left(\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}} \right)_n$		<p>2 x 1</p>	<p>2</p>
<p>23</p>	<p>Za uzupełnienie schematu reakcji:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> 2  <p>benzenokarboaldehyd</p> </div> <div style="margin: 0 10px;">+ NaOH</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="display: flex; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>alkohol</p> </div> <div style="font-size: 2em;">+</div> <div style="text-align: center;">  <p>sól kwasu karboksylowego</p> <p><i>lub</i></p>  </div> </div> </div>		<p>1</p>	<p>1</p>

24	a) Za podanie nazwy systematycznej: (kwas) 2-metylopropanowy		1	2					
	b) Za narysowanie wzoru: CH₃-CH₂-CH₂-COOH		1						
25	Za napisanie wzoru sumarycznego tymolu: C₁₀H₁₄O lub każdy inny zapis, w którym podano właściwe liczby atomów C, H i O w dowolnej kolejności		1	1					
26	a) Za ocenę prawdziwości zdań:		1	2					
	<table border="1"> <tr> <td>1. Karwakrol i tymol to izomery, ponieważ mają taki sam wzór sumaryczny, ale różnią się wzorami strukturalnymi.</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>2. W cząsteczkach obu związków sześciu atomom węgla można przypisać hybrydyzację sp², a czterem atomom węgla – hybrydyzację sp³.</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>3. Cząsteczki karwakrolu i tymolu są chiralne.</td> <td>F</td> </tr> </table>	1. Karwakrol i tymol to izomery, ponieważ mają taki sam wzór sumaryczny, ale różnią się wzorami strukturalnymi.	P		2. W cząsteczkach obu związków sześciu atomom węgla można przypisać hybrydyzację sp ² , a czterem atomom węgla – hybrydyzację sp ³ .	P	3. Cząsteczki karwakrolu i tymolu są chiralne.	F	
1. Karwakrol i tymol to izomery, ponieważ mają taki sam wzór sumaryczny, ale różnią się wzorami strukturalnymi.	P								
2. W cząsteczkach obu związków sześciu atomom węgla można przypisać hybrydyzację sp ² , a czterem atomom węgla – hybrydyzację sp ³ .	P								
3. Cząsteczki karwakrolu i tymolu są chiralne.	F								
	b) Za ocenę prawdziwości zdań:		1						
	<table border="1"> <tr> <td>1. Karwakrol i tymol są fenolami, tworzą więc z roztworem chlorku żelaza(III) kompleksy o charakterystycznym zabarwieniu.</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>2. Karwakrol i tymol <u>nie wykazują</u> zdolności tworzenia estrów.</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3. Karwakrol i tymol <u>nie ulegają</u> reakcji nitrowania.</td> <td>F</td> </tr> </table>	1. Karwakrol i tymol są fenolami, tworzą więc z roztworem chlorku żelaza(III) kompleksy o charakterystycznym zabarwieniu.	P	2. Karwakrol i tymol <u>nie wykazują</u> zdolności tworzenia estrów.	F	3. Karwakrol i tymol <u>nie ulegają</u> reakcji nitrowania.	F		
1. Karwakrol i tymol są fenolami, tworzą więc z roztworem chlorku żelaza(III) kompleksy o charakterystycznym zabarwieniu.	P								
2. Karwakrol i tymol <u>nie wykazują</u> zdolności tworzenia estrów.	F								
3. Karwakrol i tymol <u>nie ulegają</u> reakcji nitrowania.	F								

27	<p>Za napisanie wzorów – po 1 p. za każdy wzór:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Produkt organiczny reakcji I:</p>  <p>lub</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Produkt organiczny reakcji II:</p>  </div> </div>		2 x 1	2												
28	<p>Za uzupełnienie tabeli:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Właściwość</th> <th style="width: 20%;">Numer wzoru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Odwodnienie (dehydratacja) tej substancji jest laboratoryjną metodą otrzymywania etenu (etylenu).</td> <td style="text-align: center;">II</td> </tr> <tr> <td>2. Związek ten ulega reakcji hydrolizy zasadowej i kwasowej.</td> <td style="text-align: center;">IV</td> </tr> <tr> <td>3. W warunkach laboratoryjnych związek ten jest gazem o charakterystycznym zapachu, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc roztwór o odczynie zasadowym.</td> <td style="text-align: center;">V</td> </tr> <tr> <td>4. Związek ten reaguje z wodnym roztworem NaOH, tworząc sól, a nie reaguje z kwasem solnym.</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> <tr> <td>5. Addycja wody do tej substancji (wobec HgSO₄ i H₂SO₄) stanowi ważną metodę otrzymywania etanolu.</td> <td style="text-align: center;">I</td> </tr> </tbody> </table>	Właściwość	Numer wzoru	1. Odwodnienie (dehydratacja) tej substancji jest laboratoryjną metodą otrzymywania etenu (etylenu).	II	2. Związek ten ulega reakcji hydrolizy zasadowej i kwasowej.	IV	3. W warunkach laboratoryjnych związek ten jest gazem o charakterystycznym zapachu, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc roztwór o odczynie zasadowym.	V	4. Związek ten reaguje z wodnym roztworem NaOH, tworząc sól, a nie reaguje z kwasem solnym.	III	5. Addycja wody do tej substancji (wobec HgSO ₄ i H ₂ SO ₄) stanowi ważną metodę otrzymywania etanolu.	I		za 5 poprawnych odpowiedzi – 2 p. 4 lub 3 odpowiedzi – 1 p. 2 lub mniej odpowiedzi – 0 p.	2
Właściwość	Numer wzoru															
1. Odwodnienie (dehydratacja) tej substancji jest laboratoryjną metodą otrzymywania etenu (etylenu).	II															
2. Związek ten ulega reakcji hydrolizy zasadowej i kwasowej.	IV															
3. W warunkach laboratoryjnych związek ten jest gazem o charakterystycznym zapachu, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc roztwór o odczynie zasadowym.	V															
4. Związek ten reaguje z wodnym roztworem NaOH, tworząc sól, a nie reaguje z kwasem solnym.	III															
5. Addycja wody do tej substancji (wobec HgSO ₄ i H ₂ SO ₄) stanowi ważną metodę otrzymywania etanolu.	I															
29	<p>a. Za podanie wzoru i nazwy związku X:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$ </div> <p>Wzór związku X:</p> <p>Nazwa systematyczna związku X: 2-metylopropan-2-ol</p>	Jeśli zdający napisze poprawny wzór i poda poprawną nazwę produktu ubocznego (2-metylopropan-1-olu), należy przyznać punkt.	1	3												

	<p>b. Za określenie typu reakcji 1 i 2: Typ reakcji 1: eliminacja Typ reakcji 2: addycja</p>		1	
	<p>c. Za określenie mechanizmu reakcji 2: Mechanizm reakcji 2: elektrofilowy</p>		1	
30	<p>Za metodę rozwiązania prowadzącą do powiązania szukanej z danymi Za obliczenia i podanie wzoru sumarycznego: C₃H₆O</p> <p>Przykład rozwiązania:</p> <p><u>I sposób</u></p> $\frac{M_{C_nH_{2n}O} + M_{CH_2}}{M_{C_nH_{2n}O}} = 1,241$ $\frac{x + 14}{x} = 1,241$ $\frac{14}{x} = 0,241 \Rightarrow x = 58$ $12n + 2n + 16 = 58$ $n = 3 \Rightarrow C_3H_6O$ <hr/> <p><u>II sposób</u></p> $\frac{14n + 16 + 14}{14n + 16} = 1,241$ $\frac{14}{14n + 16} = 0,241$ $n = 3 \Rightarrow C_3H_6O$ <hr/>		1 1	2

31	<p>Za uzupełnienie równań reakcji – po 1 p. za każde równanie:</p> $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_3^+)\text{COO}^- + \text{OH}^- \rightleftharpoons \boxed{\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COO}^-} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_3^+)\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \boxed{\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_3^+)\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$		2 x 1	2
32	<p>Za uzupełnienie tabeli – po 1 p. za każdy wzór, np.:</p> <p>Para enancjomerów:</p> $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ <hr/> <p>Para diastereoizomerów:</p> $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} \quad \text{lub} \quad \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$	<p>Należy ocenić jako poprawne wzory, w których pominięto atomy wodoru, np.:</p> $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{HO}-\text{C}- \\ \\ \text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$	2 x 1	2
Razem:			60	

